

دستورالعمل های آمادگی برای کولونوسکوپی – CLENPIQ

لطفاً یک هفته قبل از عمل خود، با دقت مطالعه کنید.

اگر رقیق کننده خون (COUMADIN, PLAVIX، و غیره)، انسولین یا داروهای دیابت دیگری مصرف می کنید، لطفاً به ما اطلاع دهید و برای دستورالعمل ها، با پزشک تجویزکننده خود مشورت کنید. پزشک تجویزکننده شما باید تعیین کند که مصرف رقیق کننده های خون را قبل از عمل متوقف کنید یا ادامه دهید.
بیروی نکردن از این دستورالعمل ها می تواند منجر به لغو عمل شود.

اطلاعات عمومی اندوسکوپی

- روز عمل خود، آدامس نجوید یا آبنبات سفت نمکید.
- باید یک فرد بزرگسال مسئول برای همراهی کردن شما به خانه پس از عمل حضور داشته باشد. این فرد باید شما را در بخش اندوسکوپی تحويل بگیرد. اگر فرد بزرگسال مسئولی برای همراهی شما به خانه ندارد، عمل شما لغو خواهد شد.
- پس از عمل خود، نباید در مدت باقیمانده آن روز وسیله نقلیه موتوری برانید.
- نباید با تاکسی، Uber یا اتوبوس به خانه برگردید، مگر اینکه یک نفر بزرگسال مسئول همراه شما باشد.
- اگر برای شرکت بیمه شما معرفی نامه الزامی است، باید آن را با خود بیاورید. همچنین، لطفاً کارت(های) بیمه جاری، پرداختی مشترک (در صورت اطلاق) و کارت شناسایی عکس دار به روز خود را در روز عمل با خود بیاورید.
- مطب ما با شرکت بیمه شما تماس خواهد گرفت تا پوشش را تأیید کند و در صورت لزوم، مجوز قلبی برای عمل شما را کسب کند. با وجود این، مجوز قلبی ضمانت پرداخت نیست و مسئولیت هر گونه کاستنی، پرداختی مشترک، بیمه مشترک و/یا کلیه مخارج نقدی دیگر مختص طرح بیمه بر عهده شما خواهد بود.
- بسته به پیشینه خانوادگی، پیشینه شخصی، تشخیص های گوارشی قبلی یا یافته های هیچ کولونوسکوپی شما، ممکن است عمل شما پیشگیرانه یا تشخیصی تلقی شود. این موضوع فقط پس از اتمام عمل مشخص خواهد شد و بر مبنای یافته های معاینه شما خواهد بود. طبق تجربه ما، بسیاری از شرکت های بیمه کولونوسکوپی های پیشگیرانه و تشخیصی را به طور متفاوتی پوشش می دهند و در نتیجه، ممکن است پرداختی نقدی شما نیز متفاوت باشد. اگر درباره پوشش بیمه خود سؤالی دارید، لطفاً مستقیماً با شرکت بیمه خود تماس بگیرید.

اگر سؤال دیگری دارید، لطفاً در ساعت کاری عادی با مطب پزشک GI خود تماس بگیرید.

بسته آماده سازی روده CLENPIQ

بسته آماده سازی روده CLENPIQ به صورت یک رژیم دوز دوبخشی (2 روزه) مصرف می شود. اولین بطری 6 اونسی CLENPIQ را ساعت 5:00 عصر روز قبل از کولونوسکوپی خود مصرف می کنید. دومین بطری 6 اونسی CLENPIQ را صبح روز کولونوسکوپی خود (5 ساعت قبل از عمل) مصرف می کنید. مهم است که آب اضافی را طبق توصیه ارائه شده در دستورالعمل های استفاده بنوشید. هر دو بطری 6 اونسی برای آماده سازی کامل الزامی است.

روز قبل از عمل:

1. در تمام طول روز، فقط مایعات شفاف بنوشید. نباید هیچ گونه غذای جامد مصرف شود. مایعات شفاف شامل آب، آبگوشت یا سوپ شفاف، آب سیب، آب انگور سفید، لیموناد بدون پوره، اسپرایت، جینجر ایل، قهوه یا چای بدون شیر یا خامه غیرلبنی، Jello ساده (بدون میوه یا چاشنی افزوده)، قرمز، ارغوانی یا آبی ممنوع. رژیم مایعات شفاف را در زیر ببینید.

شیر ننوشید

هیچ چیزی به رنگ قرمز یا ارغوانی خورید یا ننوشید
نوشیدنی های الکلی ننوشید

2. مراحل 1 تا 4 را با استفاده از (1) بطری 6 اونسی از ساعت 5:00 ب.ظ تکمیل کنید:

مرحله 1:
یک (1) بطری 6 اونسی CLENPIQ را مستقیماً از بطری آن بنوشید.

مرحله 2:
آب رسانی بدن خود را حفظ کنید: 5 فنجان (5 تا 8 اونس) مایعات شفاف بنوشید.

مرحله 3:
حتماً تمام محتوای بطری را به طور کامل بنوشید. آب رسانی بدن خود را حفظ کنید و 5 فنجان مایعات شفاف را ظرف 5 ساعت مصرف کنید.

3. در حین آماده سازی یا بعد از آن، نباید هیچ گونه غذای جامدی مصرف شود.

روز عمل:
1. 5 ساعت قبل از زمان عمل: دومین دوز CLENPIQ را شروع کنید و به آب رسانی ادامه دهید:

مرحله 1:
دومن بطری 6 اونسی CLENPIQ را مستقیماً از بطری آن بنوشید. حتماً تمام محتوای آن را به طور کامل بنوشید.

مرحله 2:
آب رسانی بدن خود را حفظ کنید: حداقل 3 فنجان (3 تا 8 اونس) مایعات شفاف بنوشید. نوشیدن مایعات را 4 ساعت قبل از نوبت عمل خود به اتمام برسانید.

توجه: باید نوشیدن آخرین لیوان آب را حداقل 4 ساعت قبل از عمل خود یا طبق دستورالعمل های ارائه شده تمام کنید.

2. مهم است که دوز باقیمانده را حداقل 4 ساعت قبل از نوبت عمل خود به اتمام برسانید.
3. از 4 ساعت قبل از عمل خود، هیچ چیزی از راه دهان مصرف نکنید.
4. هیچ گونه آینبات سفت نخورید یا آدامس نجویید.
5. لباس راحت بپوشید که درآوردن آن آسان باشد و جواهرات خود را در خانه بگذارید.
6. خود را به «مجموعه عمل های سرپایی» در طبقه اول بیمارستان اصلی معرفی کنید.
7. پس از ورودتان به «مجموعه اندوسکوپی»، از شما خواسته خواهد شد روپوش بیمارستان بپوشید. یکی از پرستاران پیشینه پزشکی شما را با شما مرور خواهد کرد (فهرست داروهای فطی، آرژی ها و یک نسخه از

- جدیترین EKG خود را به همراه بیاورید). یک سرم درون وریدی (IV) برای بیهوشی شما در طول عمل کار گذاشته خواهد شد.
8. پس از اتمام عمل، به مدت حداقل 1 ساعت در اتاق بهبودی خواهید ماند.
 9. دکتر شما نتایج عمل را با شما در میان خواهد گذاشت و یک نسخه کتبی از گزارش را به شما خواهد داد.

*ممکن است افراد هنگام نوشین محلول، دچار نفخ یا حالت تهوع شوند که امری غیرعادی نیست. اگر استفراغ یا علایم بیگر باعث نگرانی شما شد، لطفاً در طول ساعات کاری عادی با مطب پزشک GI خود تماس بگیرید.

لطفاً توجه داشته باشید: بسیار مهم است که آماده سازی های فهرست شده فوق را انجام دهید تا دکتر بتواند تمام پس روده شما را ببیند. پس روده شما باید عاری از هر گونه مدفعه باشد. آماده سازی نامناسب ارزش این عمل را محدود می کند و ممکن است لازم شود نوبت دیگری برای انجام این معاینه تنظیم کنید.

* اگر نیاز دارید نوبت خود را تغییر دهید یا لغو کنید، لطفاً با مطب پزشک GI خود تماس بگیرید.

پرسش های متداول:

زمان عمل من بعد از ظهر است. آیا می توانم صبح چیزی بخورم؟
پاسخ: خیر به منظور تضمین اینمی شما در طول عمل، لازم است شکم خالی باشد. هر گونه غذا یا مایعات در شکم در زمان عمل، شما را در معرض ریسک استنشاق این مواد به درون شش قرار می دهد که منجر به عارضه جدی به نام سینه پهلوی استنشاقی می شود. می توانید تا 4 ساعت قبل از زمان عمل خود، آب بنوشید.

روز قبل از کولونوسکوپی خود صحبانه (نهار یا شام) خورده ام. آیا اشکالی دارد؟
پاسخ: اگر دستورالعمل های آماده سازی به طور صحیح رعایت نشده باشد، ممکن است مدفعه ته مانده در پس روده باقی بماند و یافته های مهمی را از پزشک معاین پنهان کند. در برخی موارد، اگر آماده سازی پس روده خوب نباشد، ممکن است مجبور شوید آماده سازی و معاینه را دوباره انجام دهید. اگر به طور ناخواسته روز قبل از معاینه خود غذای جامدی خورید، لطفاً تماس بگیرید و درخواست کنید با یکی از اعضای پرسنل پرستاری صحبت کنید. ممکن است از شما خواسته شود نوبت خود را تغییر دهید.

همراهی برای رساندنم به خانه ندارم. آیا اشکالی دارد؟
پاسخ: خیر. اگر فرد بزرگسال مسئولی برای همراهی شما به خانه ندارد، عمل شما لغو خواهد شد.

از چند روز قبل از عمل باید مصرف Coumadin, Plavix یا سایر داروهای رقیق کننده خون را متوقف کنم؟
پاسخ: اگر هر گونه داروی رقیق کننده خون مصرف می کنید، لطفاً به متخصص اندوسکوپی خود اطلاع دهید. به طور کلی، باید مصرف داروهای رقیق کننده خون را از 5-7 روز قبل از برخی عمل ها متوقف کنید؛ اما باید با متخصص اندوسکوپی و پزشک تجویز کننده خود مشورت کنید تا اطمینان یابید که انجام این کار برای شما ضروری و این است.

در روز قبل از عمل و روز عمل چه داروهایی را می توانم مصرف کنم؟
پاسخ: روز قبل از عمل خود، داروهایتان را طبق روال عادی مصرف کنید. اما بیمارانی که از هر گونه روش آماده سازی پاکسازی روده استفاده می کنند باید توجه داشته باشند که ممکن است به مدت ممتدی دچار اسهال شوند که می تواند منجر به دفع داروهای خوراکی از سیستم بدن شما قبل از اثرگذاری آنها شود. صبح قبل از عمل خود، باید هر گونه داروی فشار خون یا قلب خود را با جرعه کوچکی آب مصرف کنید. می توانید بیشتر داروهای دیگر را متوقف

کنید و پس از اتمام عمل خود آنها را مصرف کنید. اگر درباره دارو(ها)ی خاصی سؤال دارید، لطفاً با یکی از اعضای پرسنل بالینی ما تماس بگیرید.

من دیابتی هستم. آیا انسولین خود را مصرف کنم؟

پاسخ: باید این سؤال را از پزشکی بپرسید که این دارو را برای شما تجویز کرده است. لطفاً صبح روز عمل خود، قند خونتان را طبق روال عادی اندازه بگیرید. اگر درباره مدیریت دیابت خود همراه با پرهیز خوراک برای عمل اندوسکوپی سؤالی دارید، لطفاً با پزشک اصلی خود مشورت کنید.

داروی مسکن مصرف می کنم. آیا می توانم قبل از عمل خود این دارو را مصرف کنم؟

پاسخ: بسیاری از داروهای مسکن تجویزی می توانند اثر مخالفی با داروهای مورد استفاده ما برای بیهوشی داشته باشند و به این دلیل توصیه می کنیم که در روز عمل خود، مصرف داروی مسکن را تا پس از تکمیل عمل خود به تعویق بیندازید. اگر سؤالی دارید، لطفاً با یکی از اعضای پرسنل بالینی ما تماس بگیرید.

در دوره قاعدگی خود هستم. آیا باید نوبت کولونوسکوپی خود را تغییر دهم؟

پاسخ: خیر. دوره قاعدگی شما تداخلی با توانایی پزشک برای تکمیل عمل شما ایجاد نخواهد کرد.

آیا می توانم مصرف قرص های آهن خود را ادامه دهم؟

پاسخ: خیر. آهن می تواند باعث تشکیل مدفوع تیره رنگ شود که در صورتی که آمده سازی شما کمتر از میزان بهینه باشد، می تواند تکمیل کولونوسکوپی را برای پزشک دشوار کند. توصیه می کنیم مصرف مکمل های آهن خوراکی را حداقل از یک هفته قبل از عمل خود متوقف کنید.

تحت درمان آسپرین برای قلب بوده ام. آیا باید مصرف آن را ادامه دهم؟

پاسخ: آسپرین می تواند در لختگی خون تأثیر بگذارد. لطفاً با متخصص اندوسکوپی و پزشک تجویزکننده خود مشورت کنید.

فردا کولونوسکوپی دارم. آمده سازی پس روده خود را به موقع شروع کرده ام، اما حالا دچار اسهال و/یا احساس نفخ شده ام. باید چکار کنم؟

پاسخ: حالت تهوع، استفراغ و حس پر بودن شکم یا نفخ می تواند هر زمانی پس از شروع آمده سازی پس روده آغاز شود. با وجود این، لازم است تمام داروی آمده سازی را مصرف کنید. برای بیشتر افراد، معمولاً یک ساعت استراحت در بین آمده سازی کمک می کند. پس از استراحت، مصرف داروی آمده سازی را طبق دستور ادامه دهید. اگر دوباره دچار استفراغ شدید یا علایم وخیم تر شد، لطفاً با پزشک خود تماس بگیرید.

CLENPIQ داروی آمده سازی مورد استفاده بزرگسالان برای پاکسازی پس روده قبل از کولونوسکوپی است. **CLENPIQ** باعث اسهال شدن شما می شود و از این طریق باعث پاکسازی پس روده می شود. پاکسازی پس روده به مسئول درمانی شما کمک می کند در حین کولونوسکوپی، داخل پس روده را واضح تر ببیند.

اطلاعات اینمی مه

- اگر مسئول درمانی شما گفته است که شما دچار مشکلات جدی کلیه، انسداد در روده (گرفتگی شکم)، بازشدنگی در دیواره شکم یا روده ها (آمده سازی شکم)، گشادشدنگی مضاعف روده (انبساط سمی روده)، مشکل در تخلیه غذا و مایعات از شکم (فلج معده) یا آرژی به هر کدام از ترکیبات موجود در **CLENPIQ** هستید، **CLENPIQ** را مصرف نکنید.

- CLENPIQ و سایر داروهای آماده سازی شکم می توانند منجر به اثرات جانبی جدی شوند، شامل از دست رفتن جدی مایعات بدن (کم آبی بدن) و تغییر نمک های خون (الکترولیت ها). ممکن است این تغییرات منجر به ضربان غیرطبیعی قلب شود که می تواند منجر به مرگ، تشنج (حتی اگر تابه حال هرگز دچار تشنج نشده باشد) یا مشکلات کلیوی شود. اگر دچار مشکلات قلبی یا مشکلات کلیوی هستید یا قرص آب یا داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs) (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) مصرف می کنید، احتمال اینکه با CLENPIQ دچار فقدان مایعات و تغییر در نمک های خون شوید بالاتر است. مسئول درمانی شما می تواند پس از اینکه CLENPIQ را مصرف کردید، آزمایش خون بگیرد تا تغییرات خون شما را بررسی کند. اگر در اثر فقدان بیش از حد مایعات بدن (کم آبی بدن) دچار هر کدام از علایم زیر شدید، بلاfacسله به مسئول درمانی خود اطلاع دهید: استفراغ، تهوع، نفخ، سرگیجه، درد در ناحیه شکم، ادرار کمتر از حد عادی، دشواری نوشیدن مایعات شفاف، دشواری بلعیدن، تشنج یا مشکلات قلبی.
- CLENPIQ می تواند منجر به اولسر روده یا مشکلات روده (کولیت ایسکمیک) شود. اگر دچار درد شدید در ناحیه شکم (بطن) یا خون ریزی مقعدی شدید، بلاfacسله به مسئول درمانی خود اطلاع دهید.
- رایج ترین اثرات جانبی CLENPIQ شامل حالت تهوع، سردرد و استفراغ می شود. اینها تمامی اثرات جانبی ممکن CLENPIQ نیستند. برای اطلاعات بیشتر، از دکتر یا داروساز خود سؤال کنید. به شما توصیه می شود اثرات جانبی منفی داروهای نسخه دار را به FDA گزارش دهید. از www.fda.gov/medwatch بازدید کنید یا با 1-800-FDA-1088 تماس بگیرید.

اگر هر گونه سؤال یا نگرانی خاصی دارید، لطفاً تماس بگیرید.

ارادمند،

تیم پژوهشی گوارش Inova
(Inova Gastroenterology Team)